

3 ความเข้าใจผิด โรคพิษสุนัขบ้า ไม่ถูกกัด ก็ติดได้ !



1 ❌ เกิดเฉพาะฤดูร้อน
✅ ติดเชื้อได้ทุกฤดู

2 ❌ เลี้ยงในบ้าน ไม่ต้องฉีดวัคซีน
✅ อาจมีสัตว์ติดเชื้อเข้าบ้าน
กัดสัตว์เลี้ยงโดยที่เราไม่รู้
จึงควรฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าทุกปี

3 ❌ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ 100%
✅ ถ้าร่างกายไม่แข็งแรง
วัคซีนก็อาจสร้างภูมิคุ้มกัน
ได้ไม่เต็มที่ ฉะนั้นยังต้องระวัง

การติดเชื้อ

ถูกสุนัขกัด เลีย ข่วน หรือน้ำลาย
จากสัตว์ที่ติดเชื้อกระเด็นเข้าบาดแผล
หรือตา จมูก ปาก ก็อาจติดเชื้อได้

อาการ

เริ่มแสดงหลังรับเชื้อ 3 สัปดาห์ - 1 ปี

เริ่มแรก : ไข้ต่ำ เบื่ออาหาร
และคลื่นรุนแรงบริเวณแผลถูกกัด
กระสับกระส่าย หนาวสั่น กลืนลำบาก
ระยะสุดท้าย : แขนขาอ่อนแรง
แน่นหน้าอก หดสติและเสียชีวิต

วิธีปฐมพยาบาล



1 ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด
และฟอกสบู่หลาย ๆ ครั้ง
ช่วยลดเชื้อได้ 80%



2 ทายาเบตาดีน
และพบแพทย์โดยเร็วที่สุด
เพื่อรักษาและฉีดวัคซีน



3 ฉีดวัคซีนให้ครบ
ตามที่แพทย์นัด

ข้อควรรู้

ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ติดเชื้อจึงมีโอกาสเสียชีวิต 100%

ที่มา : กรมควบคุมโรค, โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน